



**Pharmacie  
Carlin**  
-Herboriste -

ANSM - Mis à jour le : 06/07/2023

**Dénomination du médicament**

**ERYFLUID, lotion  
Erythromycine base**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que ERYFLUID, lotion et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ERYFLUID, lotion ?
3. Comment utiliser ERYFLUID, lotion ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ERYFLUID, lotion ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE ERYFLUID, lotion ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : Anti-infectieux pour le traitement de l'acné, code ATC : D10AF02.

ERYFLUID est une solution cutanée qui contient de l'érythromycine, un antibiotique à usage local qui détruit certaines bactéries présentes sur la peau.

Il est utilisé pour traiter l'acné chez les adolescents et les adultes.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ERYFLUID, lotion ?

### **N'utilisez jamais ERYFLUID, lotion :**

- Si vous êtes allergique à l'érythromycine, à un antibiotique de la même famille que l'érythromycine ou à l'un des autres composants contenus dans ERYFLUID (voir la rubrique 6. Contenu de l'emballage et autres informations),
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'érythromycine ou à un antibiotique de la même famille (les macrolides).

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ERYFLUID.

### **Faites attention avec ERYFLUID, lotion :**

Ce médicament n'est pas destiné à un usage oral. Ne pas avaler.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ce médicament contient de l'alcool. Vous devez donc éviter tout contact avec les muqueuses (par exemple l'intérieur du nez) et les zones fragiles telles que le cou, le pourtour des yeux

En cas d'irritation excessive, votre médecin pourra vous demander de diminuer le nombre d'application.

### **Autres médicaments et ERYFLUID, lotion**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **ERYFLUID, lotion avec des aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

ERYFLUID peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Ne pas appliquer sur les seins durant l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **ERYFLUID, lotion contient du propylène glycol et de l'éthanol.**

Ce médicament contient :

§ 977,34 mg de propylène glycol par dose journalière équivalent à 182 mg/ml.

§ 533,6 mg d'alcool (éthanol) par ml. Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

## 3. COMMENT UTILISER ERYFLUID, lotion ?

### Précaution

## **Produit inflammable.**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer pendant l'utilisation ou la manipulation du flacon.

## **Posologie**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La fréquence d'administration habituelle est de 1 à 2 applications par jour.

En cas d'irritation excessive, votre médecin pourra vous demander de diminuer le nombre d'application ou dans certains cas votre médecin pourra vous demander d'interrompre le traitement.

### **Utilisation chez les enfants**

Aucune donnée n'est disponible chez les enfants de moins de 12 ans.

## **Méthode d'administration**

Voie cutanée. Ne pas avaler.

Avant d'appliquer EYFLUID, vous devez d'abord effectuer un nettoyage de la peau.

Appliquer ERYFLUID, lotion à l'aide d'un coton sur une peau préalablement nettoyée et séchée.

Se laver les mains après application.

## **Durée du traitement :**

En moyenne le traitement dure 1 à 3 mois, jusqu'à amélioration.

**Si vous avez utilisé plus de ERYFLUID, lotion que vous n'auriez dû :**

Sans objet.

**Si vous oubliez d'utiliser ERYFLUID, lotion :**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser ERYFLUID, lotion :**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir avec une fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- Une sensation de sécheresse de la peau en début de traitement.
- Des réactions cutanées telles qu'une irritation, une démangeaison ou des rougeurs.

- En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Prenez immédiatement contact avec un médecin si vous faites l'expérience d'une réaction cutanée sévère : éruption squameuse rouge avec masses sous la peau et des cloques (pustulose exanthématique). La fréquence de cet effet indésirable est indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance ? Site Internet :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER ERYFLUID, lotion ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ERYFLUID après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Produit inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de la lumière.

Bien refermer le flacon après usage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient ERYFLUID, lotion**

- La substance active est :

Erythromycine base..... 4,00 g  
Pour 100 ml de lotion

- Les autres composants sont :

Ethanol 96 pour cent\*, macrogol 400, propylène glycol\*.

\*Voir rubrique 2 'ERYFLUID contient'.

### **Qu'est-ce que ERYFLUID, lotion et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme d'une solution cutanée limpide et incolore. Flacon de 30 ml, 60 ml ou 100 ml.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
LES CAUQUILLOUS  
81500 LAVAUUR

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
PARC INDUSTRIEL DE LA CHARTREUSE  
81100 CASTRES

### **Fabricant**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
SITE PROGIPHARM  
RUE DU LYCEE  
45500 GIEN

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

### **CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE**

#### **QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,

- et la durée de traitement.

**En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

- 1. N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.**
- 2. Respectez strictement votre ordonnance.**
- 3. Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.**
- 4. Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**
- 5. Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.**